



Universidade
Federal de
Uberlândia

PROFLIN - EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA E LÍNGUA PORTUGUESA PARA
ESTRANGEIROS

GABARITO

EXAMES DE FEVEREIRO DE 2023

LÍNGUA ESPANHOLA


BIOMÉDICAS/TECNOLÓGICAS

Esta é a compilação do gabarito do exame PROFLIN de língua espanhola aplicado em FEVEREIRO/2023. Neste documento, você terá acesso a:


- Explicação de como acessar as questões da tentativa do(a) participante do exame, na plataforma Moodle
- Texto-base disponibilizado na plataforma Moodle, para resolução das questões;
- Questões da forma como disponibilizadas na plataforma Moodle;
- Gabarito indicando as respostas corretas para as questões de múltipla escolha, seguidas de justificativas tanto para a alternativa correta como para os distratores; respostas esperadas para as questões discursivas.

ATENÇÃO! ESTE NÃO É UM ESPELHO DO SEU EXAME PROFLIN! ESTE É UM GABARITO COM AS RESPOSTAS ESPERADAS DE TODOS OS CANDIDATOS E PODERÁ EMBASAR RECURSOS, DE ACORDO COM O QUE CONSTA EM EDITAL.


Após salvar todas as respostas da Prova, clique em **“Enviar tudo e terminar”**:



Após confirmar **“Enviar tudo e terminar”**, será aberta uma página de revisão com todas as respostas que foram salvas.



Você poderá salvar ou imprimir essa página com todas as respostas que você preencheu e finalizar clicando em **“Terminar revisão”**. Caso queira novamente ter acesso à página de revisão, mesmo após o término da prova, basta clicar no link **“Revisão”** estará localizado abaixo de **Resumo das suas tentativas anteriores** dentro do questionário com as Questões 1-7.



Cirugía robótica en ginecología: revisión de la literatura

Robotic surgery in gynecology: review of literature

Radamés Rivas-López^{1*} y Francisco A. Sandoval-García-Traves²

¹Servicio de Ginecología, Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México; ²Servicio de Ginecología, Hospital de la Mujer, Morelia, Michoacán, México

Resumen

Antecedentes: La cirugía robótica conlleva el potencial de transformar la cirugía laparoscópica al proporcionar, por primera vez, instrumentos con extremos distales que imitan los intrincados movimientos de la mano humana, mientras que al mismo tiempo proporciona al cirujano una alta definición con visión tridimensional del campo operatorio. **Objetivo:** Describir la aplicación clínica de la cirugía robótica en padecimientos ginecológicos benignos, así como los componentes del sistema robótico Da Vinci Si, analizando las ventajas y desventajas que este tipo de abordaje quirúrgico brinda a la paciente y a su vez al cirujano. **Método:** Revisión de la bibliografía en PubMed y UpToDate buscando las palabras clave de nuestra revisión. Criterios de inclusión: artículos de casos o series que contuvieran los apartados de la aplicación de la cirugía robótica en ginecología y resultados clínicos. **Resultados:** Se encontraron 50 artículos científicos que incluían en sus títulos las palabras clave de nuestra revisión. Se descartaron 22 artículos, 14 por ser inaccesibles, tres debido a que estaban publicados en boletines sin factor de impacto y cinco porque no se obtuvo información sobre los resultados del investigador, su volumen, visibilidad y estructura. Se escogieron para esta revisión 28 artículos. **Conclusiones:** La cirugía robótica ha evolucionado hasta ser un campo aparte, con un enorme potencial para su futuro desarrollo. Los resultados muestran que esta tecnología es aplicable y capaz de ofrecer un adecuado tratamiento a pacientes seleccionadas.

Palabras Clave: Cirugía ginecológica. Cirugía robótica. Histerectomía robótica. Infertilidad. Miomectomía robótica.

Abstract

Background: Robotic surgery carries with it the potential to transform laparoscopic surgery by providing, for the 1st time, instruments with distal ends that mimic the intricate movements of the human hand while at the same time providing the surgeon with a high-definition, three-dimensional view of the operative field. **Objective:** To describe the clinical application of robotic surgery in benign gynecological conditions, as well as the components of the Da Vinci Si robotic system, analyzing the advantages and disadvantages of this type of surgical approach that it provides to the patient and in turn to the surgeon. **Method:** Review of the literature in PubMed and UpToDate where the keywords of our review were searched. Inclusion criteria: Articles of cases or series containing the sections of the application of robotic surgery in gynecology and clinical results. **Results:** We found 50 scientific articles that included in their titles the key words of our review. 22 articles were discarded, 14 because they were inaccessible, 3 because they were published in bulletins without an impact factor and 5 because no information was obtained about the researcher's results, their volume, visibility and structure. A total of 28 articles were chosen for this review. **Conclusions:** Robotic surgery has evolved to be a separate field, with enormous potential for

Correspondencia:

*Radamés Rivas-López

Camino Santa Teresa, 1055-129

Col. Héroes de Padierna, Del. Magdalena Contreras

C.P. 10700, Ciudad de México, México

E-mail: radamesrl@hotmail.com

Fecha de recepción: 31-07-2018

Fecha de aceptación: 08-09-2018

DOI: 10.24875/CIRU.18000636

Cir Cir. 2020;88(1):107-116

Contents available at PubMed

www.cirugiaycirujanos.com

0009-7411/© 2018 Academia Mexicana de Cirugía. Publicado por Permanyer. Éste es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

future development. The results show until now that this technology is applicable and capable of offering an adequate treatment to selected patients.

Key Words: *Robotic surgery. Gynecological surgery. Robotic hysterectomy. Infertility. Robotic myomectomy.*

Introducción

La cirugía de mínima invasión es punta de lanza en la vanguardia de la tecnología, y la cirugía robótica es parte de este nuevo desarrollo.

En esta revisión de la bibliografía se incluyen las principales cirugías ginecológicas que se benefician ampliamente con el uso de esta tecnología robótica, tales como la histerectomía, la miomectomía, la recanalización tubárica, la sacrocolpopexia, la endometriosis y el cerclaje transabdominal. Así mismo, se analizan las ventajas y desventajas de esta tecnología, así como la influencia del tipo de entrenamiento y de la curva de aprendizaje en este tipo de abordaje quirúrgico.

La cirugía laparoscópica ha evolucionado rápidamente en diversas especialidades. En el área de la ginecología, la cirugía asistida por robot se utiliza en diferentes procedimientos, principalmente en histerectomías por enfermedades benignas y en miomectomías, y también en casos de recanalización tubárica, linfadenectomía, endometriosis y sacrocolpopexia.

La cirugía asistida por robot logró desarrollar avances técnicos que superan a la cirugía laparoscópica, como¹:

- Visión en tercera dimensión (3D).
- Alta definición visual en la consola.
- Movimientos de las pinzas similares a los de la mano del médico.
- Mejor posición ergonómica durante la cirugía que evita el cansancio.

Los cirujanos que practican la cirugía robótica en padecimientos ginecológicos benignos coinciden en que en algunos casos se reducen la pérdida de sangre y la necesidad de transfusiones, así como el tiempo de estancia hospitalaria y de reintegración a las actividades cotidianas, aunque comúnmente en los primeros casos de cada cirujano el tiempo quirúrgico puede ser más largo que la cirugía laparoscópica, dependiendo de la curva de aprendizaje de cada uno¹.

Existen diferentes opiniones en cuanto a las ventajas y desventajas que ofrece la cirugía robótica frente a la cirugía laparoscópica en padecimientos ginecológicos benignos. Por ello, deben conocerse, como en cualquier otro tipo de cirugía, las ventajas de este sistema o abordaje quirúrgico y los riesgos potenciales inherentes a

toda cirugía, y notificarlos a la paciente mediante un consentimiento informado antes de la intervención.

Como en cualquier otra técnica quirúrgica, es importante que el cirujano se entrene y certifique conforme a las guías que cada institución hospitalaria indica para la práctica de la cirugía robótica, y que se mantenga actualizado constantemente mediante las herramientas que proporciona la cirugía robótica para asegurarse del uso correcto de esta tecnología y mantener siempre la destreza buscando la seguridad de la paciente en todo momento¹.

El objetivo de esta revisión bibliográfica es describir la aplicación clínica de la cirugía robótica en padecimientos ginecológicos benignos.

Método

Revisión de la bibliografía en las bases de datos de los sitios web de PubMed y UpToDate, en los que se buscaron las palabras clave de nuestra revisión.

Identificación de los estudios

La búsqueda fue realizada por dos revisores independientes buscando primero los títulos de las palabras clave, y luego se analizaron los resúmenes. No hubo controversias entre los revisores.

Criterios de inclusión

- Artículos completos en inglés o español desde 1980.
- Artículos de casos o series de casos que contuvieran los apartados de la aplicación de la cirugía robótica en ginecología y resultados clínicos.

Criterios de exclusión

- Artículos con información incompleta.
- Artículos sin aplicación clínica.

Selección de los estudios

Se realizaron el análisis y el seguimiento de las publicaciones científicas en revistas indexadas en los

buscadores de PubMed y UpToDate en el periodo de 1980 a 2018. Después de la identificación de 50 estudios se realizó una revisión bibliométrica para identificar los autores de referencia sobre los temas abordados en nuestra revisión, el lenguaje y la temática, y se descartaron 22 artículos: 14 porque no fue posible su obtención durante la revisión bibliográfica y los ocho restantes porque durante la revisión se identificó que tres estaban publicados en boletines sin factor de impacto y de los cinco restantes no se obtuvo información sobre los resultados del investigador, su volumen, visibilidad ni estructura. Finalmente, se seleccionaron para esta revisión 28 artículos.

Extracción y análisis de los datos

Durante la investigación, primero se buscaron en inglés los títulos de las palabras clave y posteriormente se analizaron de manera cualitativa los textos de los 28 artículos seleccionados para la revisión, constatando su validez científica y sobre todo su aplicación clínica en nuestro medio.

Resultados

Antecedentes de la cirugía robótica

1. *Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño.*
2. *Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley.*
3. *Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda leyes.*

Lo anterior es un fragmento de la novela futurista de Isaac Asimov *Yo, robot*, escrita en 1950, que muestra cómo el ser humano siempre ha mantenido un especial interés por el tema robótico¹.

En un inicio los robots fueron desarrollados para actuar de manera autónoma por *Stanford Research Institute, Department of Defense, The National Aeronautics and Space Administration*, para poder atender a los soldados heridos desde un lugar seguro de manera remota. Con el paso del tiempo se dejó de utilizar la tecnología para la telecirugía y se enfocó en mejorar la técnica de cirugía con mínima invasión.

La cirugía asistida por robot surge como una solución para superar los obstáculos que se tienen en la cirugía de mínima invasión, ya que los cirujanos optaban por otras técnicas quirúrgicas al enfrentarse al

tiempo que implicaba la curva de aprendizaje, el tiempo quirúrgico que muchas veces implica el procedimiento y el cansancio físico que conlleva al contar con visión bidimensional, y los grados de movimientos limitados y la réplica del temblor de la mano del médico².

La cirugía robótica utiliza la base de la cirugía laparoscópica complementando con extremos distales que imitan los movimientos de la mano, y además proporciona visión 3D de alta definición, lo que hace que la técnica sea aún menos invasiva al realizar cortes más finos y precisos.

En 2005 se inician los procedimientos en ginecología al ser aprobado por la Food and Drug Administration (FDA). A partir de esa fecha se realizan más de 2000 procedimientos, con un crecimiento del 25% anual, y los médicos y hospitales impulsan la cirugía robótica y el desarrollo de la tecnología en este ámbito, por lo que surge el *Committee on Gynecologic Practice en la Society of Gynecologic Surgeons* (SGS) para regular la información que se brinda a los pacientes, así como para evaluar prácticas, resultados y datos, siempre enfocado a la seguridad del paciente³.

El sistema quirúrgico Da Vinci para procedimientos ginecológicos se introdujo en México en el año 2014, siendo el medio privado el principal realizador de esta cirugía hasta el día de hoy. Actualmente México cuenta con robot Da Vinci en cuatro hospitales privados y cuatro hospitales de la red pública del país; hay seis en Ciudad de México, uno en Monterrey y otro en el Estado de México.

Componentes del robot

Actualmente, la única plataforma aprobada por la FDA y por la Secretaría de Salud en México es el sistema quirúrgico Da Vinci modelo Si, manejado por Intuitive Surgical (Sunnyvale, CA) (Fig. 1).

El sistema quirúrgico robótico Si consta de los siguientes componentes:

- Un robot que cuenta con tres o cuatro brazos interactivos con trocares de acero inoxidable, más otro brazo que no es manipulado por el robot, sino por el asistente (Fig. 2).
- Una cámara y sistema de visión que permite ver la imagen en 3D de la pelvis, lo que mejora la percepción de la profundidad (Fig. 3).
- Instrumentos que simulan el movimiento de la muñeca (*endowrist*), es decir, que traducen los movimientos mecánicos del cirujano en tiempo real dentro del paciente (Fig. 3).



Figura 1. Consola del cirujano.



Figura 3. Visor 3D de la consola maestra.



Figura 2. Brazos robóticos.



Figura 4. Endowrist y pedales.

- Una consola maestra donde el cirujano se sienta frente a la pantalla, al lado del paciente, y desde ahí controla los instrumentos robóticos a través de pinzas que toma con los dedos, y la cámara con la combinación de controles con los pedales y el embrague, con las siguientes funciones (Fig. 4):
 - Movimientos: derecha-izquierda, arriba-abajo, entrada-salida.
 - Control de la cámara y del enfoque, reposicionamiento de los controles manuales.
 - Activación de la fuente de energía monopolar y bipolar.

Durante la cirugía, el médico es capaz de manipular, reposicionar, cortar, diseccionar, coagular y suturar. Aunque el cirujano es prácticamente autónomo, sigue siendo necesario un asistente cuya función es la realización de intercambios, succión e irrigación, así como la introducción de suturas.

Ventajas

La cirugía robótica ofrece innumerables ventajas sobre la cirugía abierta, por lo que esta no sería un buen punto de comparación. La cirugía robótica debe compararse con la cirugía laparoscópica convencional, y sobre ella tiene varias ventajas:

- La posición ergonómica del médico durante la cirugía, que reduce la fatiga y el malestar. En algunos casos de cirugía laparoscópica, el médico puede tener problemas para manipular los instrumentos y llegar al abdomen de la paciente; en cambio, en la cirugía robótica el cirujano está sentado cómodamente en la consola y manipula los instrumentos mediante las pinzas en sus dedos y los pedales³.
- La capacidad del sistema robótico de reducir a cero el efecto del temblor (tremor) del cirujano adicionando precisión y fineza al procedimiento quirúrgico³.

- Instrumentos que simulan la anatomía de la muñeca al contar con siete grados de libertad de movimiento, lo que permite que los movimientos sean naturales y en la dirección que desee el médico. Esto se denomina *instrumentación Wristed*, que proporciona mayor destreza durante la cirugía (Fig. 4)³.
- Visión tridimensional y ampliación de las imágenes mediante el ángulo de las cámaras, y alta definición de las imágenes, lo que permite al cirujano contar con una visión exacta e identificar planos tisulares, vasos sanguíneos y nervios. Se ha reportado en estudios comparativos que estas características facilitan que disminuya la pérdida de sangre en las pacientes³.
- Mediante la pantalla, el médico puede escribir y dar instrucciones a los ayudantes en cualquier momento de la cirugía. Si se cuenta con un sistema con doble consola, el médico puede señalar y pasar el control al cirujano de la consola vecina para continuar con el procedimiento quirúrgico³.
- Habilidad para controlar cuatro instrumentos quirúrgicos, incluida la cámara, lo que permite al cirujano operar con muy poca asistencia por parte del equipo quirúrgico³.

Desventajas

Existen realmente pocas desventajas al utilizar el sistema quirúrgico robótico una vez que se ha logrado alcanzar la curva de aprendizaje. Quizás, haciendo a un lado el costo del equipo en un país en vías de desarrollo, uno de los desafíos para todos los cirujanos es cambiar el paradigma de la falta de tacto en el robot; es decir, al igual que en la cirugía laparoscópica convencional, la ausencia de poder tocar y sentir con las manos cambia por la excepcional visión que se tiene usando la plataforma quirúrgica Da Vinci³⁻⁵.

La robótica en procedimientos ginecológicos

La cirugía robótica en el campo de las enfermedades ginecológicas benignas tiene una amplia indicación. En esta revisión nos enfocaremos exclusivamente en los seis procedimientos principales realizados en patología benigna, que son histerectomía, miomectomía, sacrocolpopexia, reanastomosis tubárica, endometriosis y cerclaje transabdominal.

HISTERECTOMÍA

La histerectomía es el segundo procedimiento ginecológico más común en los EE.UU., con aproximadamente 433,000 casos al año. Se puede realizar de varias maneras: vaginal, por laparoscopia o abdominal. Aunque más de la mitad de los casos se realizan como cirugía abdominal, desde el año 2010 la tendencia es cada vez mayor hacia la cirugía de mínima invasión⁵. Sin embargo, el presupuesto para la cirugía robótica es limitado y en dos estudios realizados aleatoriamente por la SGS en forma comparativa con la laparoscopia en 148 pacientes, en 2010, el tiempo quirúrgico fue significativamente más largo en la histerectomía asistida por robot (29 minutos con cirugía laparoscópica y 77 minutos con cirugía robótica). El estudio no reportó diferencias en cuanto a pérdida sanguínea, tiempo de estancia hospitalaria, nivel de dolor posoperatorio ni tiempo de recuperación^{6,7}.

En otro estudio realizado de 2007 a 2010 en 264,758 mujeres sometidas a histerectomía con patología benigna, en 441 hospitales, comparando cirugía robótica y cirugía laparoscópica, se registró un tiempo de hospitalización de menos de 2 días (24.9 vs. 19.65%), aunque el estudio no especifica la estancia media general de las pacientes; sin embargo, el costo aumentó de manera significativa en la cirugía robótica (\$2,189 aproximadamente por cada caso). No se registró ninguna diferencia en cuanto a las tasas de transfusión y las complicaciones hospitalarias⁸.

Un nuevo estudio, usando datos de pacientes de 2009 a 2010, concluyó que la cirugía robótica costaba \$2,489 más que las histerectomías laparoscópicas, pero las transfusiones disminuyeron y los casos de neumonía posoperatoria también disminuyeron en el grupo de pacientes operadas por cirugía asistida por robot⁵.

Otro estudio comparativo entre histerectomía robótica y cirugía abierta realizado por Silasi, et al.⁹ en 2013 incluyó 60 pacientes, 30 en el grupo de cirugía robótica y 30 en el grupo de laparotomía, con una edad entre 39 y 65 años, un índice de masa corporal en promedio de 30 (obesidad I) y úteros de más de 1 kg en ambos grupos. Se observó que, si bien en los casos de cirugía robótica se requirió mayor tiempo operatorio, la estancia intrahospitalaria y el sangrado intraoperatorio fueron significativamente menores que con la laparotomía⁶⁻⁹.

Un estudio que sí pudo facilitar datos comparativos entre la cirugía robótica y la laparoscópica fue el de Payne y Dauterive¹⁰, realizado en 2008. Revisaron de

manera retrospectiva los últimos 200 casos consecutivos. Entre los grupos de pacientes operadas por laparoscopia y por cirugía asistida por robot no se encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo operatorio y el sangrado, aunque el doble de las pacientes operadas por cirugía laparoscópica tuvieron que convertirse a cirugía por laparotomía¹⁰.

El *American College of Obstetricians and Gynecologists* y la SGS, después de estudiar los casos desde 2007, recomiendan el registro de los procedimientos asistidos por robot para informar sobre eventos adversos y documentar ventajas y complicaciones de la técnica¹⁰.

En un análisis con metodología rigurosa que comparó los resultados de 2300 histerectomías robóticas, 11,952 histerectomías laparoscópicas convencionales, 5,395 histerectomías por vía vaginal y 9,186 histerectomías por laparotomía en casos de patología ginecológica benigna, se llegó a la conclusión de que, en los casos de cirugía robótica cuyos cirujanos y equipo quirúrgico mantengan un alto volumen de intervenciones (mínimo 20 cirugías al año), la cirugía robótica brinda mayores ventajas que el resto de las opciones y de las vías de acceso quirúrgico¹⁰⁻¹².

Moawad, et al.¹³, en un estudio en el que compararon los pesos de las piezas quirúrgicas (útero) de cirugía robótica y de cirugía laparoscópica convencional, encontraron que el grupo de cirugía laparoscópica tuvo 47 minutos más de cirugía, un costo de \$1,648 dólares más que el grupo de cirugía robótica y una probabilidad tres veces mayor de que las pacientes tuvieran que reingresar en comparación con el grupo de cirugía robótica. Concluyen que, con un equipo quirúrgico experto de cirugía robótica, la histerectomía para úteros mayores de 750 g se asocia a menores tiempos quirúrgicos y a un costo hospitalario más bajo¹³.

Es interesante señalar que en nuestra opinión, así como en varios lugares de los EE.UU., la realización de una histerectomía debido a causas benignas deberá abordarse primariamente por vía vaginal o laparoscópica. En consecuencia, la cirugía robótica la hemos ido reservando para cirugías con mayor grado de dificultad, como los úteros con un aumento de tamaño considerable (>14 cm) o con importantes distorsiones de su anatomía, casos en los que se sospechen adherencias pélvicas significativas, por ejemplo con endometriosis, miomectomías previas, enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos pélvicos o antecedente de embolización de arterias uterinas, entre otros, en los que la disección que se requiere es muy fina y la tecnología robótica brinda excepcionales

ventajas, sobre todo en la visualización y el avance en el desempeño operatorio¹⁴.

MIOMECTOMÍA

Con la miomectomía laparoscópica se ha logrado disminuir la morbilidad posoperatoria y, al igual que en la histerectomía, el tiempo de recuperación es más rápido comparado con la laparotomía.

En cuanto a los beneficios que tiene la cirugía robótica, como un tiempo de recuperación más rápido, menos dolor posoperatorio y pronto regreso a las actividades cotidianas en comparación con la laparotomía, el tiempo quirúrgico y el costo hospitalario de la cirugía laparoscópica o la laparotomía en ocasiones pudiera llegar a ser mayor que el de la cirugía robótica. No se ha demostrado que haya menor pérdida de sangre ni que sean menores las complicaciones con la cirugía robótica en comparación con la cirugía laparoscópica.

Sin embargo, en una serie de 872 pacientes, Pitter, et al.¹⁴ señalaron que la miomectomía múltiple con asistencia robótica tuvo resultados comparables a los de la laparoscopia convencional, con un bajo índice de nacimientos pretérmino <35 semanas (17%) y reportando una sola rotura uterina (1%)¹⁴.

En nuestro país ha habido una buena aceptación para la utilización de esta plataforma en casos de miomectomías, incluyendo el nacimiento a término de bebés sin el temor de una complicación mayor como lo es la rotura uterina. Esto demuestra que la miomectomía robótica es una vía accesible, eficiente y con resultados halagüeños para pacientes con miomas y que desean un embarazo^{15,16}.

Ciertos grupos, con los que estamos totalmente de acuerdo, señalan que la cirugía robótica es una vía quirúrgica efectiva para aquellos casos de mayor complejidad, ya sea por la deformación de la anatomía o por el número de miomas, en los que la ergonomía, el sistema *endowrist* y la inigualable visión que brinda el robot serían esenciales para el buen desarrollo del caso en particular (Fig. 5)¹⁷.

REANASTOMOSIS TUBÁRICA

Las ventajas que tiene la cirugía de mínima invasión, como la precisión de los cortes, el sistema de visión ampliada en 3D y los instrumentos articulados, permiten que la reanastomosis tubárica tenga mejores probabilidades.




Figura 5. Miomectomía.

En el año 2000, Degueldre, et al.¹⁸ publicaron un estudio de ocho pacientes con esterilización laparoscópica previa de las trompas para demostrar la factibilidad de la reanastomosis tubárica asistida por robot. Se recanalizaron la totalidad de las trompas en todas las pacientes y el tiempo quirúrgico por cada trompa fue de 52 minutos en promedio. Cinco de las ocho pacientes se sometieron a histerosalpingografía, de las cuales cuatro presentaban permeabilidad bilateral y una unilateral. Hubo dos embarazos reportados dentro de los siguientes 4 meses después de la cirugía. Señalaron que el tiempo comparado con la cirugía convencional fue favorable en la cirugía asistida por robot¹⁸.

En un segundo estudio con mayor número de pacientes evaluaron la factibilidad de la reanastomosis robótica en comparación con la microcirugía por laparotomía, y encontraron que el tiempo quirúrgico con robot fue mayor (201 frente a 155 minutos con laparotomía). Sin embargo, la estancia hospitalaria fue mucho menor (4 horas con robot frente a 34.7 horas con laparotomía) y el retorno a las actividades cotidianas fue más acelerado (11 días) con la cirugía robótica que con la laparotomía (28 días). Los embarazos logrados también fueron más con la reanastomosis tubárica asistida por robot (62.5% frente a 50% con laparotomía), pero el grupo de pacientes operadas con robot tuvo un número mayor de casos de embarazo ectópico (4 frente a 1 con laparotomía). En cuanto a los costos, no hubo diferencia significativa entre las dos técnicas quirúrgicas. Lo anterior muestra que la reanastomosis tubárica en la era de la fertilización *in vitro* es un procedimiento plausible para restablecer la fertilidad en

pacientes seleccionadas que desean un embarazo posterior a una salpingoclasia bilateral¹⁹.

SACROCOLPOPEXIA

El prolapso de la cúpula vaginal es un acontecimiento cada vez más frecuente en la consulta ginecológica. Las opciones quirúrgicas de reconstrucción vaginal, como la fijación del ligamento sacroespinoso, la suspensión del ligamento uterosacro y los procedimientos con malla colocada vaginalmente son tratamientos alternativos, pero tienen diferentes niveles de eficacia y se asocian con riesgos y complicaciones²⁰.

La sacrocolpopexia robótica se ha ido desarrollando en los últimos años para tratar este tipo de padecimientos, ya que, en teoría, la realización de esta fijación sería más sencilla que la vía laparoscópica convencional y, por obvias razones, que la cirugía abierta. Geller, et al.²¹ publicaron un estudio retrospectivo 44 meses después de la intervención con 51 pacientes en el que compararon los resultados de la sacrocolpopexia asistida por robot o por laparotomía en el prolapso de órganos pélvicos. Fueron intervenidas con robot 23 pacientes y con laparotomía 28. Se encontró que entre los dos grupos de pacientes no hubo diferencias significativas en cuanto a mejoría del prolapso, función sexual y función del piso pélvico, pero las intervenidas con robot tuvieron una menor pérdida sanguínea en promedio (151 vs. 219 ml)²¹.

Carter, et al.²², en otro estudio con seguimiento de 1 año, compararon la sacrocolpopexia robótica y por laparotomía (n = 17 y n = 71, respectivamente) en pacientes con prolapso en estadio III, y encontraron

tiempos menos prolongados en la cirugía robótica (131 vs. 160 minutos), así como menores tasas de readmisión, recurrencias, días de estancia hospitalaria y complicaciones asociadas. Si se entrena a un equipo quirúrgico en la realización de cirugía robótica y sacrocolpopexia, y solo realiza este tipo de cirugía, los resultados son excelentes en términos de tiempo operatorio, que disminuye casi media hora cuando se compara con el mismo procedimiento con equipos quirúrgicos no exclusivos para el procedimiento²².

ENDOMETRIOSIS

La endometriosis es una enfermedad cada vez más habitual en nuestra sociedad que aqueja a millones de mujeres en todo el mundo, provocando diversos síntomas como dolor pélvico, dismenorrea, inflamación abdominopélvica, infertilidad, etc. El método de referencia para el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis es la cirugía laparoscópica. En los casos de endometriosis profunda, el tratamiento mediante cirugía laparoscópica convencional requiere un desempeño quirúrgico complejo que debe ser realizado en su mayoría por un equipo quirúrgico multidisciplinario. En estos casos, la laparoscopia asistida por robot podría ofrecer ventajas técnicas, como visión 3D, filtración de temblor y mejor ergonomía quirúrgica²³.

Soto, et al.²³ realizaron un estudio multicéntrico y aleatorizado que incluyó 73 pacientes (35 en el grupo de cirugía con robot y 38 en el grupo de laparoscopia convencional) intervenidas quirúrgicamente con diagnóstico de endometriosis. Encontraron un tiempo quirúrgico un poco mayor en la cirugía robótica (106 vs. 101 minutos) y no observaron diferencias significativas en cuanto a pérdida sanguínea, complicaciones intraoperatorias o posoperatorias, y tasa de conversión a laparotomía en ambas intervenciones. Además, la mejoría en calidad de vida fue similar en ambos grupos en el seguimiento a 6 meses²⁴.

Chen, et al.²⁴ realizaron un metaanálisis sobre pacientes intervenidas por endometriosis reuniendo estudios que, al igual que el de Soto, et al.²³, evaluaron los mismos parámetros, y encontraron un mayor tiempo quirúrgico en el grupo con robot que en el grupo con laparoscopia convencional, sin diferencias significativas en ambos grupos respecto a la pérdida estimada de sangre, la tasa de complicaciones y los días de hospitalización. De este modo, los beneficios de la cirugía robótica en comparación con la laparoscopia

convencional en el tratamiento de la endometriosis se sugiere deben seguir estudiándose²⁴.

CERCLAJE TRANSABDOMINAL

La insuficiencia cervical se define como una dilatación asintomática del cérvix, que ocurre en el segundo trimestre, principalmente antes de las 24 semanas²⁵.

Las indicaciones para la colocación de un cerclaje transabdominal incluyen un cuello uterino corto, ya sea congénito o amputado, una cicatriz cervical que evitaría un abordaje transvaginal y un cerclaje vaginal previo fallido. Hoy en día cada vez existen más reportes sobre la realización de cerclaje transabdominal con la asistencia de la plataforma robótica, teniendo buenos resultados transoperatorios y logrando posteriormente un embarazo a término. Los resultados han sido comparables a los de la cirugía abierta, y los costos muy similares para ambos procedimientos quirúrgicos²⁵.

Entrenamiento y curva de aprendizaje

Con la introducción de la cirugía robótica no se han establecido lineamientos claros que describan cómo debe ser el entrenamiento y en qué debe consistir²⁶.

Para el entrenamiento de la cirugía robótica hay varios aspectos similares al de la cirugía laparoscópica; sin embargo, la calidad de las imágenes y los movimientos intuitivos de los instrumentos hacen que sea más ágil el entrenamiento en cirugía robótica. Creemos que es fundamental y de vital trascendencia que, para entrenarse en cirugía robótica, el médico esté capacitado en cirugía laparoscópica²⁶.

A diferencia de la cirugía laparoscópica, el médico está más cómodo durante el procedimiento robótico, ya que la posición ergonómica en la que se sienta a un lado de la paciente disminuye la fatiga y el cansancio, lo que permite que se entrene más rápido y pase la curva de aprendizaje en menor tiempo, aunque depende de su destreza y habilidad²⁶.

A pesar del rápido crecimiento de la cirugía robótica, en nuestro país no hay muchos cirujanos que se hayan capacitado para practicar esta técnica, por lo que no hay datos contundentes que demuestren cómo debe ser el entrenamiento y no está claro el número de casos que requiere cada cirujano para superar la curva de aprendizaje.

Actualmente, el entrenamiento implica práctica en un quirófano adaptado a la cirugía robótica para que

el cirujano se familiarice con el entorno, así como con las funciones del robot en cuanto a brazos, trocares y consola. El cirujano, en un inicio, aprende a realizar maniobras simples, ya sea en un cerdo o en tejido humano fresco, tales como el agarre, cortes de diversos tejidos y el nudo intracorpóreo. Se sugiere que el médico practique por lo menos 8 horas en la consola robótica y quede documentado. El entrenamiento debe incluir procedimientos quirúrgicos en cerdos o cadáveres humanos^{3,27}.

Una vez que el médico concluye el entrenamiento, practicando movimientos en la consola y de forma práctica, tiene que realizar entre dos y cuatro cirugías (dependiendo de los requerimientos de la institución) con la supervisión de un experto o *proctor* asignado por la institución donde lleve a cabo su práctica (Fig. 5)^{3,27}.

El *proctor* es un médico certificado en cirugía robótica que ha cumplido con el número de casos que la institución establece y ha superado la curva de aprendizaje. Durante las cirugías se podrá sentar ocasionalmente en la consola para asesorar y aconsejar al cirujano. La pantalla táctil de la torre robótica, en donde se puede escribir y dibujar, es un instrumento útil que se aplica en estos casos^{3,27}.

Un estudio retrospectivo evaluó el comportamiento del aprendizaje en la técnica en procedimientos ginecológicos. Se concluyó que los tiempos quirúrgicos se estabilizaron después de 50 casos, pero en un cirujano que realizó 100 histerectomías robóticas se encontró que los tiempos disminuyeron después de los primeros 20 casos, así como las complicaciones clínicas²⁸.

Otra ventaja que tiene la plataforma robótica es que, a través de un programa computacional incluido en el *software* de la consola maestra, el médico puede realizar ejercicios y cirugías de simulación, como un piloto de una aeronave, lo cual brinda grandes ventajas porque mantiene el estar familiarizado con las funciones de la plataforma y ayuda a no perder las habilidades y la coordinación con el sistema robótico²⁸.

Existen factores que afectan la curva de aprendizaje, tales como la complejidad de los casos, la experiencia que el médico haya tenido en cirugía laparoscópica y abdominal, y las habilidades y destrezas del equipo quirúrgico. Cada institución tiene un número mínimo de casos que cada médico tiene que cumplir para poder mantener los privilegios para efectuar cirugías asistidas por robot²⁸.

Creemos que, al igual que en otros países, a partir de este momento es responsabilidad de los cirujanos,

los hospitales y las sociedades médicas determinar el uso más rentable y productivo de esta tecnología.

Conclusiones

La cirugía de mínima invasión ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. A medida que la tecnología continúe desarrollándose seguirán evolucionando las técnicas quirúrgicas para ginecología. Es indispensable seguir con la investigación en torno a la cirugía robótica para documentar datos y resultados clínicos que fundamenten las ventajas y los beneficios que puede proporcionar a las pacientes en comparación con la laparoscopia convencional o la cirugía abierta en padecimientos específicos.

Agradecimientos

Agradecemos a la Revista la aceptación y difusión de esta publicación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses.

Financiamiento

No se necesitó ningún tipo de inversión económica para esta revisión.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía

1. Asimov I. I. Robot. Greenwich, Conn: Fawcett Publications; 1950.
2. Kwok YS, Hou J, Jonckheere EA, Hayati S. A robot with improved absolute positioning accuracy for CT guided stereotactic brain surgery. IEEE Trans Biomed Eng. 1988;35:157-60.
3. Visco AG, Advincula AP. Robotic gynecologic surgery. Obstet Gynecol. 2008;112:1369-84.

Iniciado em quarta, 15 mar 2023, 09:03
Estado Finalizada
Concluída em quarta, 15 mar 2023, 09:03
Tempo empregado 27 segundos

Questão 1

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

De acordo com o texto, a cirurgia robótica supera a cirurgia laparoscópica e



Escolha uma opção:

- ☐ à comodidade do médico durante a intervenção.
- ☐ ao tempo de duração dos procedimentos.
- ☐ à imagem tridimensional em alta definição.
- ☐ aos movimentos semelhantes aos humanos.

Questão 2

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Selecione a alternativa **correta** em relação à revisão bibliográfica.

Escolha uma opção:

- ☐ Foram desconsiderados artigos anteriores à aprovação de cirurgias robóticas
- ☐ Foram selecionados cinquenta artigos publicados em periódicos *online*.
- ☐ Foram descartados catorze artigos científicos por não serem acessíveis.
- ☐ Foram considerados artigos publicados em periódicos sem fator de impacto.



Questão 3

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Selecione a alternativa **incorreta** relacionada ao tratamento da endometriose por assistidas por robô.

Escolha uma opção:

- ☐ Há diferenças consideráveis acerca da qualidade de vida.
- ☐ A taxa de mudança a cirurgia aberta é parecida.
- ☐ Não há diferenças significativas quanto à perda sanguínea.
- ☐ O período de hospitalização das pacientes é similar.

Questão 4

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Considere as seguintes afirmações para selecionar a alternativa **correta**.

- I. Na remoção de miomas uterinos, a cirurgia robótica pode ter uma duração menor que a laparotomia.
- II. A reversão de laqueadura assistida por robô resultou em um número menor de complicações com a laparotomia.
- III. As cirurgias aberta e robótica para cerclagem do colo uterino por via transabdominal.
- IV. A ausência de tato é um desafio a ser superado por cirurgiões em procedimentos robóticos.



Escolha uma opção:

- ☐ I e IV são verdadeiras.
- ☐ II e III são verdadeiras.
- ☐ III e IV são verdadeiras.
- ☐ I e II são verdadeiras.

Questão 5

Não respondido

Vale 2,00 ponto(s).

Descreva, com suas próprias palavras, os componentes do sistema cirúrgico robótico



Questão 6

Não respondido

Vale 2,00 ponto(s).

Apresente, de forma geral, as vantagens e desvantagens da cirurgia robótica par



Questão 7

Não respondido

Vale 2,00 ponto(s).

Discorra sobre a capacitação médica necessária para a realização de cirurgias ro influenciar no domínio técnico.



LÍNGUA ESPANHOLA
BIOMÉDICAS/TECNOLÓGICAS

TEXTO-BASE: RIVAS-LÓPEZ, R.; SANDOVAL-GARCÍA-TRAVERSÍ, F. A. Cirugía robótica en ginecología: revisión de la literatura. **Cirugía y Cirujanos**, Ciudad de México, v. 88, n. 1, p. 107-116, feb. 2020.

QUESTÃO 1:

Enunciado:

De acordo com o texto, a cirurgia robótica supera a cirurgia laparoscópica em muitos aspectos, **exceto** em relação

Gabarito:

ao tempo de duração dos procedimentos.

Justificativa:

Na introdução do texto, o tempo de duração dos procedimentos não é mencionado entre os avanços técnicos propiciados pela cirurgia assistida por robô. Além disso, a literatura que trata da robótica em diferentes procedimentos ginecológicos destaca o tempo de duração superior em relação a outras formas de cirurgia.

Distratores:

1) à imagem tridimensional em alta definição.

Justificativa:

Em diferentes partes do texto, destaca-se a imagem tridimensional em alta definição como uma vantagem da cirurgia robótica: “Visión en tercera dimensión (3D) y alta definición visual en la consola” (p. 108); “La cirugía robótica [...] proporciona visión 3D de alta definición, lo que hace que la técnica sea aún menos invasiva al realizar cortes más finos y precisos (p. 109); “Visión tridimensional y ampliación de las imágenes mediante el ángulo de las cámaras, y alta definición de las imágenes [...] (p. 111).

2) aos movimentos semelhantes aos humanos.

Justificativa:

Em diferentes partes do texto, destaca-se a semelhança entre os movimentos do robô e das mãos do médico como uma vantagem da cirurgia robótica: “Movimientos de las pinzas similares a los de la mano del médico” (p. 108); “La cirugía robótica utiliza la base de la cirugía laparoscópica complementando con extremos distales que imitan los movimientos de la mano [...]” (p. 109).

3) à comodidade do médico durante a intervenção.

Justificativa:

Em diferentes partes do texto, destaca-se a ergonomia como uma vantagem da cirurgia robótica: “Mejor posición ergonómica durante la cirugía que evita el cansancio” (p. 108); “La posición ergonómica del médico durante la cirugía, que reduce la fatiga y el malestar” (p. 110); “A diferencia de la cirugía laparoscópica, el médico está más cómodo durante el procedimiento robótico, ya que la posición ergonómica en la que se sienta a un lado del paciente disminuye la fatiga y el cansancio [...]” (p. 114).

QUESTÃO 2:

Enunciado:

Selecione a alternativa **correta** em relação à revisão bibliográfica.

Gabarito:

Foram descartados catorze artigos científicos por não serem acessíveis.

Justificativa:

Em “Selección de los estudios”, afirma-se: “[...] se descartaron 22 artículos: 14 porque no fue posible su obtención durante la revisión bibliográfica [...]” (p. 109).

Distratores:

1) Foram selecionados cinquenta artigos publicados em periódicos *online*.

Justificativa:

Os revisores identificaram cinquenta artigos, mas nem todos foram selecionados para a revisão bibliográfica proposta: “Finalmente, se seleccionaron para esta revisión 28 artículos” (p. 109).

2) Foram considerados artigos publicados em periódicos sem fator de impacto.

Justificativa:

Entre os 22 artigos descartados, “[...] se identificó que tres estaban publicados en boletines sin factor de impacto [...]” (p. 109).

3) Foram desconsiderados artigos anteriores à aprovação de cirurgias robóticas pela FDA.

Justificativa:

A revisão bibliográfica contempla artigos publicados no período de 1980 a 2018, portanto, foram contemplados trabalhos publicados antes da aprovação dos procedimentos pela FDA, algo que se deu em 2005: “Se realizaron el análisis y el seguimiento de las publicaciones científicas en revistas indexadas en los buscadores de PubMed y UpToDate en el periodo de 1980 a 2018” (p. 108-109); “En 2005 se inician los procedimientos en ginecología al ser aprobado por la Food and Drug Administration (FDA)” (p. 109).

QUESTÃO 3:

Enunciado:

Selecione a alternativa **incorreta** relacionada ao tratamento da endometriose por meio de intervenções laparoscópicas e assistidas por robô.

Gabarito:

Há diferenças consideráveis acerca da qualidade de vida.

Justificativa:

De acordo com o estudo realizado por Soto et al, “la mejoría en la calidad de vida fue similar en ambos os grupos en el seguimiento a 6 meses”, o que torna a afirmação incorreta (p. 114).

Distratores:

1) O período de hospitalização das pacientes é similar.

Justificativa:

No estudo realizado por Chen et al (p. 114), não foram encontradas diferenças significativas com relação aos dias de hospitalização.

2) Não há diferenças significativas quanto à perda sanguínea.

Justificativa:

Tanto Soto como Chen et al (p. 114) não observaram diferenças significativas relacionadas à perda sanguínea.

3) A taxa de mudança a cirurgia aberta é parecida.

Justificativa:

No estudo de Soto et al (p. 114), não foram observadas diferenças significativas relacionadas à taxa de conversão da cirurgia robótica e da cirurgia laparoscópica à laparotomia (cirurgia aberta).

QUESTÃO 4:

Enunciado:

Considere as seguintes afirmações para selecionar a alternativa **correta**.

- I. Na remoção de miomas uterinos, a cirurgia robótica pode ter uma duração e um custo maiores do que a laparoscopia e a laparotomia.
- II. A reversão de laqueadura assistida por robô resultou em um número menor de gestações fora do útero em comparação com a laparotomia.
- III. As cirurgias aberta e robótica para cerclagem do colo uterino por via transabdominal apresentam custos semelhantes.
- IV. A ausência de tato é um desafio a ser superado por cirurgiões em procedimentos robóticos e laparoscópicos.

Gabarito:

III e IV são verdadeiras.

Justificativa:

De acordo com o texto, em relação à afirmação III, os resultados da cerclagem transbdominal por meio de cirurgia robótica e aberta são comparáveis “y los costos muy similares para ambos procedimientos” (p. 114). Quanto à afirmação IV, entre as desvantagens da cirurgia robótica, está a ausência de tato, de poder tocar e sentir com as mãos, o que supõe um desafio para cirurgiões que realizam esse tipo de procedimento e também intervenções laparoscópicas.

Distratores:

1) I e II são verdadeiras.

Justificativa:

As afirmações I e II são falsas. Em relação à miomectomia (procedimento de remoção de miomas uterinos), afirma-se: “el tiempo quirúrgico y el costo hospitalario de la cirugía laparoscópica o la laparotomía en ocasiones pudiera llegar a ser mayor que el de la cirugía robótica” (p. 112). Quanto à reversão da laqueadura, “[...] el grupo de pacientes operadas con robot tuvo un número mayor de casos de embarazo ectópico (4 frente a 1 con la laparotomía)” (p. 113).

2) II e III são verdadeiras.

Justificativa:

Conforme justificado anteriormente, apenas a afirmação III é verdadeira.

3) I e IV são verdadeiras.

Justificativa:

Conforme justificado anteriormente, apenas a afirmação IV é verdadeira.

QUESTÃO 5:

Enunciado:

Descreva, com suas próprias palavras, os componentes do sistema cirúrgico robótico utilizado no México.

Resposta esperada:

O sistema cirúrgico Da Vinci modelo Si, único aprovado pela Secretaria de Saúde do México, é composto por um robô com braços de aço inoxidável; uma câmera capaz de captar imagens tridimensionais da pelve; instrumentos que simulam os movimentos que seriam da mão do cirurgião; um dispositivo dotado de uma tela a partir do qual o médico, na posição sentada, controla os demais instrumentos robóticos que, por sua vez, permitem a realização de diferentes movimentos.

QUESTÃO 6:

Enunciado:

Apresente, de forma geral, as vantagens e desvantagens da cirurgia robótica para retirada do útero.

Resposta esperada:

A cirurgia de retirada do útero ou histerectomia é um dos procedimentos ginecológicos mais comumente realizados e, desde 2010, registra-se uma tendência para que seja feito de forma minimamente invasiva. Na literatura especializada, entre as vantagens da cirurgia robótica para essa finalidade, são mencionados: um menor número de transfusões de sangue e de pneumonia pós-operatória e um menor tempo de hospitalização da paciente. Entre as desvantagens, os autores apontam o custo mais alto e o tempo de realização do procedimento.

QUESTÃO 7:

Enunciado:

Discorra sobre a capacitação médica necessária para a realização de cirurgias robóticas e sobre os fatores que podem influenciar no domínio técnico.

Resposta esperada:

Para a realização de cirurgias robóticas, é necessário que o médico esteja primeiramente capacitado para a realização de laparoscopia. No México, hoje em dia, é necessário que a capacitação ocorra em uma sala de cirurgia adaptada para que o cirurgião se familiarize com o ambiente e as funções do robô. No início, ele deve realizar cerca de oito horas de treinamento que envolvem manobras simples e procedimentos cirúrgicos em animais ou cadáveres humanos. A partir disso, o cirurgião deve realizar de duas a quatro cirurgias com a supervisão de um médico mais experiente e certificado em cirurgia robótica. Com a prática, a tendência é que o tempo de duração de cada procedimento ginecológico, considerado alto em comparação com outras formas de intervenção cirúrgica, se estabilize. Entre os fatores que podem interferir no domínio técnico estão a complexidade dos casos, a experiência prévia do médico em outras formas de cirurgia e as habilidades e destrezas da equipe cirúrgica.